

Số: /UBND-TH

Ia H'Drai, ngày tháng 7 năm 2020

Về việc tăng cường các hoạt
động về khoanh vùng, cách ly
y tế ổ dịch bệnh bạch hầu

Kính gửi:

- Trung tâm Y tế;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Thực hiện Công văn số 2314/UBND-KGVX ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và bạch hầu. Công văn số 2377/SYT-NVYD ngày 01/7/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn tạm thời một số hoạt động về khoanh vùng, cách ly y tế ổ dịch bệnh bạch hầu.

Trên cơ sở về tình hình dịch bạch hầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua có những diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã triển khai một số nội dung như sau:

1. Trung tâm Y tế huyện

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về công tác khoanh vùng, cách ly y tế ổ dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện.
- Tiến hành điều tra dịch tễ ca bệnh/người lành mang vi khuẩn, khoanh vùng ổ dịch theo điều tra dịch tễ để cách ly ổ dịch; lập danh sách các trường hợp bệnh nghi ngờ, tiếp xúc gần, tiếp xúc gián tiếp (qua đồ vật dính chất bài tiết của người bệnh).
- Lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp bệnh nghi ngờ, tiếp xúc gần, tiếp xúc gián tiếp. Mỗi trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đề phải kèm phiếu điều tra trường hợp lấy mẫu có thông tin đầy đủ và phiếu yêu cầu xét nghiệm; kèm danh sách tổng hợp các trường hợp lấy mẫu.
- Tổ chức cách ly điều trị tại cơ sở y tế đối với các trường hợp bệnh, nghi ngờ bệnh và người lành mang vi khuẩn (*Nếu có*).
- Xử lý môi trường vùng cách ly ổ dịch bằng Chloramin B: 02 ngày/01 lần.
- Thành lập Tổ y tế khám sàng lọc tất cả người dân trong vùng cách ly ổ dịch, phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để lấy mẫu, điều tra dịch tễ và cách ly điều trị kịp thời.
- Về tổ chức cách ly y tế ổ dịch bệnh bạch hầu: Trung tâm Y tế huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định cách ly y tế ổ dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc dự phòng Erythromycin (hoặc cùng nhóm), liều 30-50mg/kg/ngày cho trẻ em, người lớn liều 1-2g/ngày dùng trong 7- 10 ngày. Đối tượng: Mở rộng đối tượng, có thể dùng kháng sinh dự phòng cho tất cả người

dân trong vùng cách ly ổ dịch (kể cả nhân viên y tế và người tham gia cách ly ổ dịch).

- Kiểm tra, rà soát và triển khai ngay công tác tiêm đúng lịch, tiêm vét, tiêm bổ sung vắc xin DPT-VGB-Hib cho trẻ từ 02 tháng đến dưới 18 tháng tuổi, vắc xin DPT4 cho các đối tượng từ 18 tháng đến 48 tháng tuổi trong vùng cách ly ổ dịch, đảm bảo không bỏ sót đối tượng. Sau đó, mở rộng ra địa bàn toàn xã (hoặc tương đương) có ổ dịch.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền và truyền thông giáo dục sức khỏe về các triệu chứng của bệnh bạch hầu, nguy cơ mắc bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng chống để người dân tự giác, chủ động phòng chống dịch bệnh; về tác dụng, lợi ích tiêm chủng, đối tượng, lịch tiêm để người dân biết, chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch đối với tất cả các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng nói chung và vắc xin phòng bệnh bạch hầu nói riêng.

- Chủ động xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin Td (uốn ván-bạch hầu) chống dịch bạch hầu trên địa bàn huyện.

- Làm đầu mối tổng hợp số liệu báo cáo hàng ngày trước 15 giờ 00: Kết quả các hoạt động của vùng cách ly ổ dịch bạch hầu về Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện.

2. Ủy ban nhân dân các xã

- Phối hợp với ngành y tế xây dựng và ban hành phương án cách ly y tế ổ dịch bệnh bạch hầu theo quy mô thôn, cụm dân cư. Thời gian cách ly: 14 ngày, kể từ ngày khởi phát của ca bệnh cuối cùng.

- Huy động các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tham gia đảm bảo công tác cách ly y tế vùng ổ dịch bệnh bạch hầu. Người dân trong vùng cách ly ổ dịch đều phải hạn chế tiếp xúc, không tụ tập đông người; hạn chế tối đa việc di chuyển ra vào vùng cách ly. Các phương tiện ra vào vùng cách ly ổ dịch đều phải được phun khử khuẩn bằng Chloramin B. Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn vùng cách ly ổ dịch.

- Chỉ đạo và huy động các ban ngành, hội, đoàn thể và cán bộ thôn phối hợp ngành Y tế để phụ trách nhóm hộ kiểm soát người dân dùng thuốc dự phòng để phòng chống dịch bệnh bạch hầu theo chỉ định của ngành Y tế. Trong vùng cách ly ổ dịch, phải đảm bảo cấp thuốc theo từng buổi (sáng, chiều) cho từng người và uống tại nhà, tại chỗ (đảm bảo người dân phải được uống thuốc dự phòng, tránh tuyệt đối trường hợp người dân được cấp thuốc nhưng không uống).

- Tăng cường mạnh mẽ công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn; tuyên truyền và vận động người dân chấp hành các biện pháp cách ly ổ dịch; đề nghị người dân trong vùng cách ly ổ dịch mang khẩu trang thường xuyên, rửa tay với xà phòng thường xuyên, vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và thông thoáng, lau chùi nhà cửa và đồ dùng cá nhân bằng dung dịch Chloramin B hoặc dung dịch khử khuẩn thông thường.

- Báo cáo Kết quả các hoạt động của vùng cách ly ổ dịch bạch hầu về Trung tâm Y tế huyện **trước 14 giờ 00** để tổng hợp, báo cáo theo quy định .

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Pờ Ly Hảo